


【嘔吐物処理のしかた】

汚物がわずかに残っているだけでも感染源になります。
適切に処理をしましょう。



《必要物品》

- 塩素系漂白剤
(次亜塩素酸ナトリウム 5~6%)
ノロウイルスの感染力を失わせる
には塩素系漂白剤による消毒が
有効です。
- 使い捨て手袋、マスク
- 使い捨ての布 (ペーパータオルなど)
- ビニール袋
- ペットボトル (消毒液作成時使用)



処理のポイント

まず、汚染物を使い捨ての布などで **覆って換気**

- | | | |
|---|-----------------------------------|--|
| ① 処理をする前に
使い捨て手袋、マ
スクをする。 | ② 汚物を使い捨ての布
などで、できる限り拭
き取る。 | ③ ②で使用した布と手袋は、ビニール袋
に入口をしっかりと縛る。
※充分浸る程度の消毒液を入れることが望ましい |
| ④ 手袋を交換し、汚染された場所を
消毒液 に浸した布などで広範囲に10分間
覆うその後、水拭きをする。 | | ⑤ ④で使用した布や手袋をビニール袋に
入れ、そこに③のビニール袋も入れて
口をしっかりと縛り処分する。
※処分するまではできるだけ屋外に置く |

処理後はしっかり **手洗い・うがい!**

《消毒液の作り方 0.1%》 ~便や嘔吐物が付着した床、衣類、トイレの便器の消毒~

500mlのペットボトルを使用する場合

塩素系漂白剤を 50~60 倍に希釈します

塩素系漂白剤をペットボトルのキャップ2杯〔10ml〕入れ、
水を加えて全量 500ml にする。



塩素系漂白剤
(A' ユーティ
キャップ 2)

水

《リネン類の消毒》


~処理する際は、手袋マスク換気を忘れずに~

■衣類を汚したとき

できる限り汚物を取り除き、消毒液に 10 分つけ置きする。(色落ちすることあり)
その後、他の洗濯物と分けて洗濯。洗濯後は十分乾燥させる。

■布団やじゅうたんを汚したとき

できる限り汚物を拭き取り、汚染した所にスチームアイロンを 1 分間以上あてる。
その後、日光にあてて十分乾燥させる。布団乾燥機を使用する場合は、窓を開けて換気を
十分にします。



ノロウイルス現場対策より抜粋